

GENIOL
PARACETAMOL 500 MG
Comprimidos

Industria Argentina

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR GENIOL, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene Geniol?

Cada comprimido de Geniol contiene:

Principios activos: Paracetamol 500,0 mg.

Principios inactivos: Almidón pregelatinizado, povidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, opaglos, candurin silver sheen.

Acciones

Calma el dolor. Baja la fiebre.

¿Para qué se utiliza Geniol?

Indicado para el alivio sintomático del dolor leve a moderado incluyendo dolor de cabeza, migraña previo diagnóstico médico, dolor de muelas, dolor de garganta, dolores menstruales, dolores musculares, alivio sintomático de los dolores reumáticos, estados gripales y/o resfríos, y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden utilizar Geniol?

NO USE este medicamento si usted:

- es alérgico a alguno de los ingredientes, o si la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?

Consulte a su médico si usted:

- tiene enfermedad del hígado (insuficiencia hepática); su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- es menor de 12 años, salvo indicación y prescripción del médico pediatra.
- tiene enfermedad de los riñones (insuficiencia renal) moderada o severa; su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- está embarazada o está dándole el pecho a su bebé
- tiene antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, o consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomarlo.
- tiene dificultad para digerir ciertos azúcares como la lactosa (insuficiencia de lactasa, galactosemia o síndrome de malabsorción glucosa/galactosa).
- no debe excederse la dosis indicada. El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis.
- no ingiera otro medicamento que contenga paracetamol (como algunos antigripales) conjuntamente con este producto.
- tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que paracetamol puede alterarlas.
- toma medicamentos para las convulsiones (fenitoína, fenobarbital), diuréticos, anticoagulantes (acenocumarol o Warfarina), algunos antibióticos (rifampicina, isoniazida), medicamentos para el corazón (propranolol) o para alguna otra enfermedad crónica

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?

Al igual que todos los medicamentos, **Geniol** puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran.

Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que paracetamol puede afectar su funcionamiento y además afectar la acción de otros medicamentos.

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece:

- dolor de cabeza
- cambios en la orina (color o cantidad)
- ganas de vomitar (nauseas)
- mareos o inestabilidad
- cansancio, sueño, nerviosismo
- erupciones o picazón en la piel
- piel amarillenta (ictericia)
- dolor en la panza (dolor abdominal).

Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico.

Si el dolor persiste por más de 5 días o empeora o si la fiebre persiste por más de 3 días o empeora consulte a su médico.

¿Cómo se utiliza este medicamento?

Geniol es de toma por vía oral y puede ser ingerido con agua.

Como posología habitual se aconseja:

Adultos, ancianos y niños mayores de 12 años de edad:

1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg).

Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

Si usted se olvidó de tomar **Geniol**, puede tomarlo tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar al menos 4 horas antes de la próxima toma.

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos.

Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas suspenda inmediatamente y consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha utilizado más **Geniol** de lo indicado en este prospecto, consulte inmediatamente a su médico, aunque no presente síntomas.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel: (011) 4808-2655.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA)

Anmat responde: 0800-333-1234

Presentación

2 blisters de 8 comprimidos c/u, 8 blisters de 8 comprimidos c/u.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación: conservar entre 15 y 30 °C, en su envase original.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 3764.

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.

LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.
GENIOL 500 mg, Paracetamol, Comprimidos
Proyecto de prospecto-rótulo



Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532. www.elea.com