

**GENIOL FORTE**  
**PARACETAMOL 650 MG**  
Comprimidos Recubiertos

**Industria Argentina**

**Venta Libre**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR Geniol Forte**, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

**¿Qué contiene Geniol Forte?**

**Cada comprimido de Geniol Forte contiene:**

Principios activos: Paracetamol 650,0 mg.

Principios inactivos: hidroxipropilmetilcelulosa K15M; povidona; celulosa microcristalina; estearato de magnesio; dióxido de silicio coloidal 200; hidroxipropilmetilcelulosa E 15; sacarina sódica; ciclamato de sodio; dióxido de titanio.

**Acción:** Analgésico. Antifebril.

**¿Para qué se utiliza Geniol Forte?**

**Geniol Forte** se usa para el alivio sintomático de dolores de cabeza, menstruales, musculares, articulares, dentales leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

**¿Qué personas no pueden utilizar Geniol Forte?**

NO USE este medicamento si usted:

- es alérgico al principio activo paracetamol o a alguno de los principios inactivos del comprimido.
- es alérgico a la aspirina o a otros analgésicos antiinflamatorios.

**¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar Geniol Forte?**

Consulte a su médico si usted:

- tiene enfermedad del hígado (insuficiencia hepática); su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- es menor de 12 años, salvo indicación y prescripción del médico pediatra.
- está tomando otros medicamentos que contienen paracetamol, como antigripales (de prescripción o no). Si no está seguro consulte a su médico o farmacéutico.

- tiene enfermedad de los riñones (insuficiencia renal) moderada o severa; su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- tiene enfermedades del estómago como úlcera o gastritis
- tiene alcoholismo o toma 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica
- está embarazada o está dándole el pecho a su bebé.
- tiene dificultad para digerir ciertos azúcares como la lactosa (insuficiencia de lactasa, galactosemia o síndrome de malabsorción glucosa/galactosa).
- tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que paracetamol puede alterarlas.
- toma medicamentos para las convulsiones (fenitoína, fenobarbital), diuréticos, anticoagulantes (acenocumarol o Warfarina), algunos antibióticos (rifampicina, isoniazida), medicamentos para el corazón (propranolol) o para alguna otra enfermedad crónica.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.

### **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando Geniol Forte?**

Al igual que todos los medicamentos, **Geniol Forte** puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran.

Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que paracetamol puede afectar su funcionamiento y además afectar la acción de otros medicamentos.

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece:

- dolor de cabeza
- cambios en la orina (color o cantidad)
- ganas de vomitar (nauseas)
- mareos o inestabilidad
- cansancio, sueño, nerviosismo
- erupciones o picazón en la piel
- piel amarillenta (ictericia)
- dolor en la panza (dolor abdominal).

Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico.

Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas, suspenda inmediatamente y consulte a su médico.

### **¿Cómo se utiliza Geniol Forte?**

**Geniol Forte** es de toma por vía oral y puede ser ingerido con agua.

Como posología habitual se aconseja:

*Adultos y niños mayores de 12 años:* 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg ó 5 de 650 mg).

Niños menores de 12 años: consulte con su médico o farmacéutico.

Si usted se olvidó de tomar **Geniol Forte**, puede tomarlo tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar al menos 4 horas antes de la próxima toma.

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos.

Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas suspenda inmediatamente y consulte a su médico.

### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?**

Si usted ha utilizado más **Geniol Forte** de lo indicado en este prospecto, consulte inmediatamente a su médico, aunque no presente síntomas.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777
- Hospital de Niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330-160.

### **¿Dudas? ¿Consultas?**

**0800-333-3532 (ELEA)**

Anmat responde: 0800-333-1234

LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.  
**GENIOL FORTE 650 mg, Paracetamol**



### **Presentación**

Envases conteniendo 2 blisters de 8 comprimidos c/u, 8 blisters de 8 comprimidos c/u.

### **¿Cómo guardar este medicamento?**

**Modo de conservación:** conservar entre 15 y 30 °C, en su envase original.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 3764.

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532. [www.elea.com](http://www.elea.com)