

**ANALGÉSICO
ANTIINFLAMATORIO**



Paracetamol - Diclofenac

CONT.: 12 Cápsulas blandas

Venta Libre • INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR Geniol® Plus Rápida Acción, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene Geniol® Plus Rápida Acción?

Cada cápsula blanda de Geniol® Plus Rápida Acción contiene: principios activos: Paracetamol 300 mg, Diclofenac Sódico 25 mg. Principios inactivos: propilenglicol, povidona, polietilenglicol 400, agua purificada, gelatina, solución sorbitol/ glicerina, punzó 4R, lecitina de soja, triglicéridos de cadena media, tinta blanca para impresión ribbon printing opacode.

Este medicamento es libre de Gluten.



Acciones:

Analgésico. Antiinflamatorio.

¿Para qué se utiliza Geniol® Plus Rápida Acción?

Indicado para el alivio sintomático del dolor de espalda, dolores musculares y de articulaciones. Además, alivio de dolores menstruales.

¿Cómo se utiliza este medicamento?

Geniol® Plus Rápida Acción es de toma por vía oral. Preferentemente debe ser ingerido con un vaso de agua antes, durante o después de una comida. Como posología habitual se aconseja: adultos y mayores de 15 años de edad: 1 cápsula blanda cada 8 horas. Dosis máxima: 3 cápsulas blandas por día, repartidas 1 cada 8 horas. Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años: consulte con su médico. La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos. Si el dolor persiste por más de 72 horas (3 días) o empeora, consulte a su médico. Para mayor información ver prospecto en la cara interna del estuche.

¿Qué personas no pueden utilizar Geniol® Plus Rápida Acción?

NO USE este medicamento si usted: • es alérgico a Paracetamol o Diclofenac o a alguno de los demás ingredientes, o si la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. • tiene menos de 15 años; • tiene enfermedad del hígado, de los riñones o el corazón; • tiene o ha tenido úlcera gástrica o duodenal; • sufre de alcoholismo; • tiene hemorragias o alteraciones de la coagulación (dificultad para frenar hemorragias); • está tomando medicamentos anticoagulantes diuréticos.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?

Consulte a su médico si usted: • consume algún medicamento por una enfermedad crónica; • consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica; • está embarazada o dándole el pecho a su bebé; • tiene antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior (esófago, estómago) o presenta sensación de ardor o acidez; • no debe excederse la dosis indicada. El Paracetamol puede producir daño hepático

**ANALGÉSICO
ANTIINFLAMATORIO**



cuando se ingiere en sobredosis; • no ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol (como algunos antigripales) conjuntamente con este producto; • tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que Paracetamol puede alterarlas. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?

Al igual que todos los medicamentos, Geniol® Plus Rápida Acción puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas los sufran. Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que Paracetamol y Diclofenac pueden afectar su funcionamiento y además afectar la acción de otros medicamentos. Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece: • dolor de cabeza; • cambios en la orina (color o cantidad); • ganas de vomitar (náuseas) o vómitos; • diarrea o constipación • mareos o inestabilidad; • cansancio, sueño, nerviosismo; • erupciones o picazón en la piel; • piel amarillenta (ictericia) • dolor en la panza (dolor abdominal); • disminución del recuento de plaquetas en el análisis de sangre. Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico. Si el dolor persiste por más de 5 días o empeora, consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha utilizado más Geniol® Plus Rápida Acción de lo indicado en este prospecto, consulte inmediatamente a su médico, aunque no presente síntomas. Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

Fecha de última revisión: Mayo/2022.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA) Anmat responde: 0800-333-1234

Presentación:

Envase conteniendo 12 cápsulas blandas. Expendedor conteniendo 60 cápsulas blandas.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación: conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento. **MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 59.654. Director Técnico: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532 | elea.com**

